

ویژگی های فسترن:

- سمی / گشوده در صورت استنشاق
- غیر قابل احتراق
- خورنده
- بوی نامطبوع شبیه یونجه تازه
- در حالت مایع زرد روشن



- 1 استراحت فیزیکی جهت کاهش نیاز به اکسیژن
- 2 اکسیژن تراپی در صورت افت اشباع اکسیژن کمتر از ۹۴ درصد
- 3 برونکودیلاتور: نبولایزر آلپوتروپ
- 4 گلوکوکورتيكوئید وریدی: متیل پردنیزولون یا هیدروکورتیزون
- 5 تهویه غیر تهاجمی با فشار مثبت (NIPPV)
- 6 ضد سرفه، سدادیو و آرام بخش (لورازپام)، فاقد آنتی دوت
- 7 سایر: ان استیل سیستئین، ایزوپروترنول، آمینوفیلین
- 8 فاقد آنتی دوت



اقدامات درمانی در اورژانس



- بیماران با علائم خفیف**
- تحت نظر تا ۴۸ ساعت
 - شروع کورتون وریدی (۲۵۰ میلی گرم متیل پردنیزولون)
 - معاینه ریوی مکرر
 - گرافی قفسه سینه ۸ ساعت بعد و تکرار در صورت نیاز

- بیماران با ادم ریوی و نارسایی تنفسی**
- اینتوباسیون و تهویه مکانیکی
 - مداخلات اشاره شده در بالا